

COMATRICHA tenerrima (M.A. Curtis) G. Lister

Deux exemplaires sur débris végétaux. (85) Dompierre-sur-Yon « Bois des Gâts », juillet 2006, leg. A. Crusson, det. J.B., N°0607.

Sporocarpes stipités, à sommet pointu et base atténuée arrondie, ht. 0,7-0,8 mm, Ø 0,27-0,37 mm, ht. Total 2,3-2,6 mm ; couleur ocre-rosé clair.

Stipe long et mince de 1,6-1,75 mm, donc nettement plus long que le sporocarpe, Ø au sommet 0,12 mm et à la base 0,5 mm, flexueux, noir brillant, entouré d'un hypothalle en disque irrégulier.

Péridium très mince, brillant, disparaissant complètement après déhiscence.

Columelle atteignant le sommet du péridium, amincie de bas en haut, d'un noir opaque.

Capillitium naissant de toute la longueur de la columelle, très abondant, à brins primaires bruns peu épais, onduleux, aboutissant à un réseau de surface à mailles arrondies avec peu d'extrémités libres (encore s'agit-il probablement de ruptures accidentelles dues au montage de l'unique préparation qu'il m'a été possible de réaliser).

Spores ocre-rosé en masse, pratiquement hyalines sub micr., à très fines verrues presque invisibles, sauf en coupe optique, Ø 6,8-7,6 µm.

L'espèce la plus proche semble être *Comatricha pulchella* qui a une forme cylindrique à sommet obtus, et un stipe plus court que le sporocarpe.

Cette récolte est la première signalée pour notre département.

9 VIII 2006
Jacques BOIFFARD

