



## **METATRICHIA vesparium** (Batsch ) Nanneng a-Bremeka mp

(85) La Pelissonnière, 26 IV 2003, leg. A. Crusson ; sur écorce indéterminée. Det. J.B., herb. n°030426 B.

Sporocarpes obconiques accolés en bouquet sur un stipe vigoureux ; répartis en groupes assez denses sur écorce;  $\varnothing$  des sporocarpes jusqu'à 0,50 mm, hauteur totale +/- 2,75 mm.

Hypothalle indistinct

Stipe commun à 5-6 sporocarpes, épais :  $\varnothing$  0,25-0,30 mm, profondément sillonné, élargi à la base, rouge orangé.

Péridium s'ouvrant par un couvercle hémisphérique brun rouge sombre brillant, laissant échapper un capillitium expansif, très élastique, d'une éclatante couleur rouille.

Capillitium intensément coloré en L.T., brun orangé (ramifications non observées), souvent torsadé, à spires épineuses; très nombreuses extrémités libres à extrémités courtes précédées ou non d'un renflement globuleux ;  $\varnothing$  6-7  $\mu$ m.

Spores rouille en masse, jaune orangé en L.T., rondes ou largement et irrégulièrement elliptiques (9,50) 10,50-12  $\mu$ m (pour les spores elliptiques 10,60-11,70 x 9,60-10,50  $\mu$ m), densément spinulées.

Espèce classique, bien typique; toutes les illustrations sont bonnes.

N'avait pas encore, semble-t-il, été trouvée en Vendée.

21-X-2007, nouvelle récolte en tous points conforme à la première, dans la même station et par le même mycologue

