


LAMPRODERMA scintillans (Berk. et Br.) Morgan



En petit groupe clairsemé, sur tige d'ortie, Jard-sur-Mer, 11 Septembre 2000, leg. R. PACAUD.

Sporocarpes stipités, sensiblement globuleux, ↓ 0,40-0,60 mm, périidium fragile, irisé brillant bleu profond, évanescent et laissant souvent des fragments entourant le haut du pied. La plupart de nos exemplaires, vus après déhiscence, sont brun tabac.

Pied grêle, cylindrique évasé en bas lg 0,70-0,80 mm, bleu-noir brillant (noir opaque en l. t.) parsemé de spores.

Hypothalle brun rouge, en cercle autour du pied.

Columelle cylindrique, noire, pénétrant jusqu'au centre du périidium, arrondie ou clavée à l'extrémité.

Capillitium partant du sommet de la columelle, rayonnant vers la périphérie avec de nombreuses divisions et anastomoses ; brun-rouge sombre à noir sauf à l'origine, autour de la columelle, où il forme un petit halo plus clair.

Spores brun lilas sub micr., (7,65) 8,50-9,30 (10) µm, parsemées de verrues rondes assez fortes.

ICO. : LISTER pl. 130, très bonne

NANNENGA-BREMEKAMP p. 94 (traduction), très bonne.

J.B. 11 Janvier 2001
Jacques BOIFFARD