

TRICHIA PERSIMILIS
Karsten

Saint-Julien-des-Landes (85) 35/02/2001 Leg. A. Crusson

Sporocarpes sessiles, serrés les uns contre les autres, plus larges que hauts, en petits groupes compacts sur écorce de feuillu ; Ø 0,75 mm , ht. 0,65 mm.

Péridium simple, transparent, brillant, ochracé, cupuliforme à bords déchirés, surmonté du capillitium et de la masse des spores d'un jaune ocre intense avec nuance olivâtre.

Hypothallus totalement invisible

Capillitium jaune sub micr., formé de longues élatères libres à 3-4 spires épineuses reliées par des tractus longitudinaux, Ø 5-6,50 µm, et à extrémités courtes de 12-15 µm.

Spores arrondies + ou – régulièrement, 12-13,50 µm, ou un peu allongées, par ex. 13,50 x 11 µm ; ornementation imparfaitement réticulée par de larges bandes crêtées, elles-mêmes réticulées en mailles arrondies ; en coupe optique, les crêtes forment à la périphérie une couronne interrompue d'environ 0,75 µm. Les dimensions sporales sont données hors tout.

L'ornementation sporale, très complexe, est remarquablement mise en évidence par l'examen dans le bleu coton lactophéno. Le lendemain de la préparation, les spores gonflées jusqu'à 17-20-21 µm offrent à l'immersion une netteté d'image presque comparable à celles du M.E.B.
J. BOIFFARD

Iconographie :

Voir particulièrement Nannenga-Br. Illustrations p. 59 pour caractères respectifs de *Tr. favoginea*, *Tr. affinis* et *Tr. persimilis*

