

Ordre **Pezizales**
Famille **Pyronemataceae**

Pseudoaleuria af fibrillosa (Currey) Moravec, *Acta Musei Moraviae, Sci. biolog.* 88(1/2): 51 (2003)
= *Tricharina fibrillosa* (Currey) Yang & Korf



Description

Caractères macroscopiques

Apothécies 1-3 cm de diamètre, sessiles, assez profondément cupuliformes. Hyménium jaune orange un peu sale. Surface externe concolore à un peu plus pâle, finement feutrée. Marge plutôt blanchâtre ou pâle, non noirâtre.

Caractères microscopiques

Asques 250-270 x 11-12 μm , cylindriques, peu atténués à la base, pleurorynques, à sommets non amyloïdes, operculés, contenant huit spores obliquement unisériées

Paraphyses assez larges, dressées, septées, renflées en ampoule au sommet (7-8 μm) au sommet, hyalines à légèrement orangées.


Spores elliptiques, hyalines, sans goutte, lisses, avec parfois une sorte de mucus à la périphérie, 17,5-19 x 10-11 μm .

Chair à deux couches très nettes : excipulum médullaire de textura intricata et excipulum ectal de textura globulosa avec cellules assez petites.

Poils : jusqu'à 250 x 15 μm , dressés, obtus, septés et parfois étranglés vers les cloisons, hyalins !

Habitat et récoltes : leg André Crusson (Session SMF de Nouan-le-Fuselier).

Remarques : L'espèce nous oriente vers *Pseudoaleuria fimbriata* mais les spores sont un peu grandes (jusqu'à 19 μm) et la marge n'a pas de poils colorés mais des poils hyalins.



Pseudoaleuria af fibrillosa a- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets d'asques et paraphyses, d- bases d'asques, e- poils.